




Leg AG, det AG

Pelouse  
calcaire

1

2

- 1 : Asques bituniqués octosporés 90-100 x 13-18 µm, courtement stipités.  
2 : Ascospores brunes, 3 septées, se fragmentant rapidement, chacune des cellules ayant un sillon germinatif presque parallèle excepté au centre où il est sinueux, 28-32 x 5-6 µm.

Crotte

Ascomes de couleur marron foncé à noir, immergés en grande partie dans la crotte, subglobuleux à pyriformes, ne dépassant pas 120 µm de diamètre. Ne se détecte que par une étude microscopique. Peu fréquent. Nouveau pour la Côte-d'Or.

Sur crotte de sanglier (en incubation depuis 2 mois).  
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 2 janvier 2017

Peu  
fréquent

► Le genre *Sporormiella* regroupe plus de soixante espèces coprophiles, la plupart se ressemblant macroscopiquement. On comprendra que la détermination doit passer par le microscope. Parmi toutes les espèces à spores tétracellulaires, *Sporormiella minima* est, comme son l'indique, une des espèces à spores les plus petites. Une espèce comme *S. teretispora* assez fréquente dans la Réserve possède des spores beaucoup plus grandes.