



► *Russula risigallina*f. *luteorosella* (Britzelm.) Bon

Leg JCV & det JCV



1 : Spores 7-9 x 6-7 µm, elliptiques, à verrues épineuses ou obtuses mais assez fines et hautes, isolées ou avec quelques amorces de connexifs fins.

2 : Cystides cylindro-fusoïdes, 45-70 x 6-10 µm, obtuses ou un peu aiguës mais peu appendiculées.



Chapeau 1-5 cm, convexe puis vite déprimé, fragile, sec à velouté, mat, lisse, cocardé de rose et de jaune. Marge unie puis un peu cannelée. Lames adnées ou sublibres, peu serrées, crème puis jaunes, à reflets orangé vif. Stipe 2-5 x 0,5-1 cm, cylindracé ou irrégulier, fragile, blanc.

Dans la pente, sous feuillus..

Bois Plein-de-la-Belle-Croix, maille 3023D23, le 10 juillet 2017.



► Les couleurs de la russule caméléon, comme son nom vernaculaire l'indique, sont assez variables. On distingue la forme *luteorosella*, cocardée de rose et de jaune, la forme *chamaeleontina*, panachée de rouge et de jaune, avec du vert ou du verdâtre. *R. vitellina* a le chapeau visqueux, au moins au disque et collant, même par temps sec. De plus, la chair présente une odeur vinaigrée, au moins à la corruption.