


► *Lepiota magnispora* Murrill



Leg. JCV & det. JCV



1



2

1 : Spores 17-25 X 4-6 μm , longuement fusiformes.
2 : Cheilocystides, 15-50 x 5-15 μm , clavées ou atténuées sublagéniformes.

Chapeau 3-6 cm, conico-campanulé puis convexe mamelonné, à calotte discale brun châtain, squamuleux de manière concentrique, ocre orangé sur fond roussâtre. Marge à lambeaux vélaire jaunes, formant des dents triangulaires. Stipe fibrillo-floconneux d'ochracé roussâtre, sous une zone annuliforme fragile. Odeur un peu aromatique.

Dans la litière, sous feuillus, côté ubac.
Combe Saint-Martin, maille 3023D23, le 17 septembre 2017.

Feuillus

Peu fréquent

► Il semble que *Lepiota magnispora* Murril 1912 soit désormais reconnue prioritaire sur *Lepiota ventriosospora* qui vient sous épicéas, à chapeau squamuleux, orangé fauve, mais aussi sur *L. ventriosospora* var. *fulva*, sous feuillus, à couleurs moins vives ; *L. ochraceofulva*, jaunissant roussissant, possède des spores de 6-8 x 3,5-4,5 μm .