






Leg. JCV & det. JCV



1



2



3

1 : Spores 8-11,5 x 4,5-6 µm, cylindracées à larmiformes allongées, amyloïdes.

2 : Cheilocystides 50-75 x 5-15 µm, fusiformes ou cylindracées, à pigment intracellulaire plus ou moins rouge.

3 : en cutis, à hyphes x 2-8 µm, à excroissances relativement courtes.

Chapeau 0,5-2 cm, conique, campanulé, hygrophane, un peu ridulé, brun rougeâtre sur le frais, très pâlisant au sec, devenant même blanchâtre. Marge striée. Lames sublibres, peu serrées, blanchâtres mais à arête brun rougeâtre. Stipe 3-6 x 0,1-0,2 cm, fragile, à longs poils pâles en bas, subconcolore. Chair pâle ou concolore, fragile. Odeur alcaline forte.

Dans la pelouse (*Xerobromion*), au pied des pins, dans les aiguilles. Brochon, Champ Sement, maille 3023D21, le 21 septembre 2017.

► *M. roseofusca*, de taille souvent modeste, à chapeau brun rosé et à stipe moins poilu à la base a les mêmes lames bordées de brun-rouge et aussi une légère odeur nitreuse et vient dans les pelouses moussues.

