




Leg. AG & det. AG



1 : Asques bituniqués octosporés 125-150 x 11,5-14,5 µm.

2 et 3 : Ascospores ellipsoïdes ou oblongues, brun foncé, 17,5-21 x 8,5-10,5 µm, à une cloison centrale épaisse, verruqueuses à tuberculées.



Stromas noirs valsoïdes présents sous l'écorce, dans le bois, la perçant pour laisser en surface des ostioles difformes, donnant parfois l'impression de pustules. Peu fréquent.

Sur faux-baguenaudier (*Colutea arborescens*).

Les Cuzetiers, maille 3023D21, le 2 décembre 2017.



► L'étude du genre *Valsaria* n'est pas aisée. Cinq champignons proches, ont longtemps été regroupés sans différenciation sous le nom de *Valsaria insitiva*. Une étude de 2015 a clarifié le sujet, mais cela reste difficile. On retiendra que *V. rudis* vient sur *Quercus cerris* et *Q. petraea*, *V. lopadostomoides* sur *Q. ilex*, *V. insitiva* sur *Vitis* et non Fabacées, *V. robiniae* sur *Colutea*, *Robinia*, *Amorpha* et *Hippocrepis* et enfin *V. spartii* sur autres Fabacées, *Fraxinus*, *Spiraea*, *Melia* et *Acer sempervirens* en aire subméditerranéenne.