




Leg. & det. JCV



1 : Spores elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, 9-11 × 3,5-4.

2 : Dimitique: hyphes génératrices larges de 2-5 µm, cloisonnées et le plus souvent bouclées; hyphes squelettiques à parois épaisses, ramifiées, larges de 2,5-6 µm.

Bois mort

Feuillus

Fructification stipitée, flabelliforme, 10-50 mm de diamètre. Surface pileuse lisse, un peu ridulée radialement vers la marge, glabre, ocre-jaune à l'état frais, puis orange-brun par la suite. Face inférieure finement porée, blanche dans la jeunesse, puis crème à ocre-brun. Pied central ou excentrique, cylindrique ou faiblement conique, 10-40 (50) x 3~10 mm, crème à brunâtre, lisse, mat; base ou moitié inférieure noire, nettement limitée.

Sur une branche morte attenante à l'arbre.

Combe Chaudron, maille 3023D23, le 15 août 2018.

► *Cerioporus leptocephalus* (= *Polyporus varius*) pourrait être confondue avec *P. badius* et *P. melanopus*, mais la première a des hyphes non bouclées alors que la seconde possède un pied entièrement noir et ridé longitudinalement. Les petits exemplaires de *P. varius* mesurant 10-30 mm de diamètre sont considérés comme variété *nummularius* par certains auteurs.

Fréquent