



Leg. JCV & det. JCV

Feuillus

- 1 : Spores 4,5-6,5 x 3-4,5  $\mu\text{m}$ , elliptiques à ovoïdes.
- 2 : Cystides de petite taille, 15-50 x 3-6  $\mu\text{m}$ , souvent capitées.
- 3 : Structure dimitique : Hyphes squelettiques profondes et parfois rares, x 5-4  $\mu\text{m}$ , incrustées de nombreux petits cristaux. Hyphes génératrices x 2-5  $\mu\text{m}$ .

Charme

Basidiome plus ou moins appliqué pouvant couvrir de grandes surfaces et atteignant 5 mm d'épaisseur, blanc à crème ochracé. Marge fibrilleuse, pâle. Pores vite déchirés (1-5 par mm), parfois en grosses dents ou plaquettes inégales, dessinant souvent un motif labyrinthe.

**Sur une branchette de charme, à terre.  
Combe Saint-Martin, maille 3023D14, le 25 mars 2019.**

Fréquent

- Les pores semblent moins laciniés chez *S. flavispora* qui a des spores plus petites (5,5-5 x 2,5-5,5  $\mu\text{m}$ ) et des cystides atténuées incrustées. *S. radula* a des spores de 4-5,5 x 5-4  $\mu\text{m}$  et des cystides fusiformes à subcapitées.