


# ► *Cheimonophyllum candidissimum*

377

Berk. & M.A. Curtis) Singer



1 : Spores globuleuses, subglobuleuses, à paroi mince, hyalines, non amyloïdes, 5-6 (6,5) x 4,5-5,5 µm.

2 : Cheilocystides formant une arête lamellaire stérile de cellules similaires à celles du pileipellis, étroites, 2-3 µm.



Chapeau (0,15) 0,3-1 cm, semi-circulaire, délicat, soyeux, finement pubescent blanc sur fond blanchâtre, d'aspect crayeux, crème à jaunâtre avec l'âge, à marge enroulée à incurvée au début. Lames adnées à subdécurrentes, assez larges, atténuées vers les bouts, minces, blanches, Pied rudimentaire, centré ou latéral, blanchâtre. Chair très mince, molle, flexible, blanchâtre à jaunâtre.

Sur une branchette, à terre (*Xerobromion*).

Pelouse d'Arvaux, maille 3022D22, le 25 novembre 2016.

► *Cheimonophyllum candidissimum* se caractérise par son minuscule chapeau pleurotoïde, sessile ou à court pied latéral, blanc, sec, sa sporée blanche, ses spores arrondies et sa pousse sur bois mort. Si l'on ne vérifie pas la couleur blanche de la sporée de ce petit "pleurote", il est facile de le confondre avec des crépidotes ou des entolomes pleurotoïdes, à lames matures et sporée colorées.