



Leg. & det. RRx

1

1 : Spores 5-6 X 3,5-4,5 µm, lisses, ellipsoïdes, hyalines, guttulées.

Chapeau 3-10 cm, fibrillo-pelucheux, gris, gris noir à brunâtre avec la marge qui rougit. Lames blanches échancrées, à arête rougissante. Stipe un peu clavé, avec quelques taches bleu-vert ou jauni par le mycélium. Chair pâle se tachant de rougeâtre, à saveur farineuse et à odeur farineuse complexe, parfois désagréable.

Sentier au départ du parking de la route d'Etaules.

Feuillus et conifères mêlés. Maille 3022D24, le 30 octobre 2017.

► Le rougissement, la stature et les taches bleu-vert le distingue bien de ses nombreux sosies. *T. terreum* (bon comestible) est gris noir, sans odeur. *T. basirubens* rougit nettement à la base du pied. *T. atosquamosum* est à squames noires et sent le poivre. *T. squarulosum* est tout envahi de mèches noires. *T. sciodes* devient amer à la mastication. *T. scalpturatum*, à forte saveur et odeur farineuses, jaunit fortement avec l'âge. Enfin, *T. gausapatum* offre une zone cortiniforme haute, *T. cingulatum* est lui orné d'un anneau cotonneux délicat. Se méfier de *T. pardinum*, montagnard toxique.

