

**CITEAUX Réserve intégrale**

Feuillus (chênes, charmes, hêtres, bouleaux) sol limoneux acide

~ 10 participants sur le terrain

MdA : J.Claude, Joël, Denis, Alain, Henri, Robert, Paule

CR : Paule

<i>Lepiota</i>	<i>magnispora</i>	
<i>Peziza</i>	<i>succosa</i>	coupes ochracées, <u>lait jaune</u>
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	
	<i>rubescens</i>	
	<i>gr.vaginata</i>	
	<i>excelsa var.spissa</i>	A.épaisse , brun à gris brun, nbx restes de voile, cf.possible avec A.panthère
<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	Bolet rude, chair blanche → gris-bleuté avec Fer
	<i>crocipodium</i>	Bolet craquelé, sous chênes
<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	Bolet châtain, pores bl.puis crème, <u>piéd typiquement creux</u>
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	Bolet ferrugineux
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>	Cèpe d'été, réseau blanc sur stipe
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	R.charbonnière, chap. violet-bleu-rose-vert
	<i>cyanoxantha f.peltereau</i>	
	<i>artesia</i>	R.de l'Artois, grande taille, brun pourpre noirâtre au centre,lames +stipe bl.crème
	<i>nigricans</i>	R.noircissante
	<i>lepida</i>	R.jolie, rouge rose ± décoloré, stipe un peu rosé
	<i>rosea</i>	
	<i>ochroleuca</i>	R.ocre et blanche, un peu visqueuse
	<i>atropurpurea</i>	Russule pourpre et noire
	<i>faginea</i>	Russule des hêtres, rouge vineux à brun chocolat, odeur de crustacés
	<i>fageticola</i>	
	<i>romellii</i>	Russule à <u>lames fragiles</u> bl.puis jaunes cassantes, chap.violacé+/- décoloré
	<i>vesca</i>	
	<i>acrifolia</i>	chap.blanc-rose vite en entonnoir, lames à reflets roses
<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>	Lactaire pâle uniquement sous hêtres
	<i>blennius</i>	L.visqueux, crème à centre gris, piquant sous hêtres
	<i>vellereus</i>	L.velouté, blanc
	<i>pyrogalus</i>	L.à lait brûlant, chap.gris-brun à nuances rosâtres
	<i>quietus</i>	
	<i>azonites</i>	
<i>Xerula</i>	<i>radicata</i>	Collybie radicante
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	Mycène pure, typiquement rose lilas
	<i>inclinata</i>	Mycène inclinée
<i>Marasmius</i>	<i>alliaceus</i>	Marasme à odeur d'ail long stipe gris-brun noir en vieillissant
	<i>rotula</i>	
<i>Gymnopus</i>	<i>erythropus</i>	
<i>Cortinarius</i>	<i>decipiens</i>	Cortinaire trompeur brun chocolat à bord plus clair
	<i>largus</i>	gris bleuâtre ochracé par le centre, chair un peu bleutée dans chap.
	<i>mucifluoides</i>	le stipe dégage une bonne odeur de miel si on le gratte visqueux
	<i>caperatus</i> Syn : <i>Rhozites caperatus</i>	Pholiote ridée chap.sec, pruneux 'coquille d'oeuf', bel anneau bl o
	<i>infractus</i>	gris olivâtre-ochracé, visqueux
	<i>hinnuloides</i>	brun ochracé à marge plus claire
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	Tricholome blanc surtout/chênes odeur de gaz peu agréable
	<i>sejunctum</i>	Tr. disjoint , chap. fibrilleux j.verdâtre rappelant celui de la phalloïde
	<i>saponaceum</i>	odeur de savon

	<i>ustaloides</i>	Tr.faux brûlé, brun roux sombre, <u>viscosité TRES amère</u>
	<i>sulphureum</i>	
	<i>bufonium</i>	
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	
<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	Panelle stiptique, pied élargi vers les lames → petit éventail
<i>Crepidotus</i>	<i>calolepis</i>	Crépidote mou, chap.à écailles brunes 6cm
<i>Bisporella</i>	<i>citrina</i>	très petit Ascomycète, jaune vif,disques de 0,3cm
<i>Helvella</i>	<i>elastica</i>	chap.en selle, puis bi à trilobé
<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>	Plutée du saule, chap.soyeux grisâtre à centre olivâtre
	<i>cervinus</i>	couleur de cerf
	<i>leoninus</i>	Plutée couleur lion, jaune
<i>Pholiota</i>	<i>tuberculosa</i>	chap.jaune à écailles plus colorées
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	Collybie à lames larges gros cordons mycéliens blancs
<i>Mucidula</i>	<i>mucida</i>	Collybie visqueuse, voire gluante,blanc de lait, sur bois mort de hêtre
<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	Hygrophore blanc d'ivoire, très visqueux
<i>Inocybe</i>	<i>asterospora</i>	
	<i>phaeodisca</i>	
	<i>petiginosa</i>	
	<i>xanthocephalum</i>	
<i>Coprinellus</i>	<i>truncorum</i>	pied glâbre
	<i>micaceus</i>	Coprin micacé, pied pubescent
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	
<i>Anthurus</i>	<i>archerii</i>	
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	Clavaire crête de coq
<i>Artomyces</i>	<i>pyxidatus</i>	Clavaire à pyxides, chaque rameau est terminé par une petite coupe
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	
<i>Auricularia</i>	<i>mesenterica</i>	gélatineuse, chap.feutré à face inférieure ridée, plissée
<i>Stereum insignitum</i>		Stérée dont la face inf. jaunit, face sup. brun fauve avec lignes sombres
<i>Stereum hirsutum</i>		
<i>Fomes fomentarius</i>		Amadouvier
<i>Trametes gibbosa</i>		Tramète bossue polypore blanchâtre à pores allongés étroits
<i>Fomitopsis pinicola</i>		Polypore marginé, gris → jaune orangé → marge blanche
<i>Ganoderma adspersum</i>		Ganoderme épaissi très ressemblant à <i>G.applanatum</i>
<i>Grifola frondosa</i>		Poule-des-bois, gros polypore, petits chap.agglutinés les uns sur les autres bon comestible si jeune
<i>Hydnum repandum</i>		Pied de mouton, aiguillons décurrents crèmes
<i>rufescens</i>		Pied de mouton, aiguillons adnés crème-orangé
<i>Cantharellus pallens</i>		Girolle pruneuse
<i>Craterellus cornucopioides</i>		Trompette des morts