




Les CHAMPIGNONS de la Réserve Régionale de Val-Suzon

Inventaire 2021 - Photos 851-900





Réserve Naturelle
VAL SUZON



**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE**



UNION EUROPÉENNE

Projet bénéficiaire
du Fonds européen
de développement régional



Office National des Forêts

Abrothallus microspermus - Photo 869
Agrocybe praecox - Photo 858
Aleurobotrys botryosus - Photo 897
Calocybe gambosa - Photo 885
Candelariella vitellina - Photo 893
Ceriporia alba - Photo 832
Cheirospora botryospora - Photo 862
Chromocyphella muscicola - Photo 875
Cladonia fimbriata - Photo 888
Conocybe hadrocystis - Photo 865
Conocybe hadrocystis (micro) - Photo 866
Coprinellus micaceus - Photo 886
Cucurbitaria berberedis - Photo 882
Dacrymyces stillatus - Photo 874
Diaporthe syngenesia - Photo 880
Exidia nigricans - Photo 884
Flammulaster carpophilus - Photo 887
Fomes fomentarius - Photo 861
Fomitopsis betulina - Photo 859
Fomitopsis pinicola - Photo 860
Ganoderma applanatum - Photo 900
Gymnopus hariolorum - Photo 894
Gymnosporangium clavariiforme - Photo 872
Hyaloscypha hyalina - Photo 892
Hypoxylon petriniae - Photo 855
Hypoxylon fuscum - Photo 854
Hysterobrevium smilaci - Photo 879
Lachnum virgineum - Photo 891
Lactifluus volemus - Photo 877
Lasiobolus ciliatus - Photo 889
Lentinus substrictus - Photo 898
Lentomitella cirrhosa - Photo 857
Lentomitella crinigera - Photo 856
Lophodermium foliicola - Photo 851
Lophodermium juniperinum - Photo 878
Lyomyces juniperi - Photo 871
Micula mougeotii - Photo 870
Mycena renati - Photo 890
Mycena vitilis - Photo 876
Nemania serpens - Photo 853
Peziza arvenensis - Photo 895
Polyporus leptcephalus - Photo 864
Propolis farinosa - Photo 881
Pseudosperma obsoletum - Photo 868
Resinicium bicolor - Photo 883
Resupinatus striatulus - Photo 867
Rhytisma acerinum - Photo 852
Thyronectria sinopica - Photo 863
Trametes gibbosa - Photo 899
Trichopezizella nidulus - Photo 896



Colosse...



... aux pieds d'argile


Combe-au-Prêtre, 24 mai 2021



Concentrés sur la récolte

(photo Denis Brulard)

851. – *Lophodermium foliicola*, sur feuille d'aubépine
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



852. – *Rhytisma acerinum*, sur feuille morte d'érable
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)





853. – *Nemania serpens*, sur bois mort de peuplier
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)




854. – *Hypoxylon fuscum*, sur bois mort de noisetier
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



855. – *Hypoxylon petriniae*, sur bois mort de frêne
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)

856. – *Lentomitella crinigera*, sur bois mort d'épicéa
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)





857. – *Lentomitella cirrhosa*, sur bois mort de noisetier
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



858. – *Agrocybe praecox*, herbe rase
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



859. – *Fomitopsis betulina*, sur bois mort de bouleau
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



860. – *Fomitopsis pinicola*, sur bois mort d'épicéa
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)

861. – *Fomes fomentarius*, sur bois mort de peuplier
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



862. – *Cheirospora botryospora*, sur lierre
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)






863. – *Thyronectria sinopica*, sur bois mort de lierre
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



864. – *Polyporus leptcephalus*, sur feuillus
16 avril 2021 – Le Grand Pré (Leg. & det. AG)



865. – *Conocybe hadrocystis*, sur bois mort de feuillus
11 mai 2021 – Chênaux (Leg. Denis Brulard)




866. – *Conocybe hadrocystis*, micro

1. Revêtement hyméniforme; 2. Spores lisses; 3. Pore germinatif visible, (au moins sur quelques spores) tronqué; 4. Cheilos clavées; 4. Spores de moins de 10 µm

867. – *Resupinatus striatulus* , bois mort, feuillus
11 mai 2021 – Chênaux




868. – *Pseudosperma obsoletum*, litière, sous feuillus
11 mai 2021 - Chênaux



869. – *Abrothallus microspermus*, sur *Flavoparmelia*
 11 mai 2021 – Chênaux (Leg. AG ; det. AG)



870. – *Micula mougeotii*, sur Nerprun des Alpes
 11 mai 2021 – Chênaux (Leg. Fabrice Tattu ; det. AG)



871. – *Lyomyces juniperi*, sur genévrier
11 mai 2021 – Chênaux



872. – *Gymnosporangium clavariiforme*
11 mai 2021 – Chênaux

(Leg. Marlène Tréca)



873. – *Ceriporia alba*, sur chêne
11 mai 2021 – Chênaux



874. – *Dacrymyces stillatus*, sur genévrier
11 mai 2021 – Chênaux (Leg. Denis Brulard)



875. – *Chromocyphella muscicola*, sur les mousses
11 mai 2021 – Chênaux (Leg. Françoise Meyer)



876. – *Mycena vitilis* , litière de feuillus
11 mai 2021 – Chênaux (Leg. Denis Brulard)

877. – *Lactifluus volemus*, en lisière

11 mai 2021 – Chênaux


(Photo ?)



878. – *Lophodermium juniperinum*, sur feuilles


11 mai 2021 – Chênaux

(Leg. & det. AG)





879. – *Hysterobrevium smilacis*, sur genévrier
11 mai 2021 – Chênaux (Leg. Françoise Meyer; det. AG)



880. – *Diaporthe syngenesia*, sur épine-vinette
11 mai 2021 – Chênaux (Leg. AG ; det. AG)



881. – *Propolis farinosa*, sur genévrier

11 mai 2021 – Chênaux

(Leg. Françoise Meyer ; det. AG)




882. – *Cucurbitaria berberedis*, sur épine-vinette

11 mai 2021 – Chênaux

(Leg. AG ; det. AG)

883. – *Resinicium bicolor*, bois mort, feuillus
18 mai 2021 - Chênaux



884. – *Exidia nigricans*, sur noisetier
18 mai 2021 – Chênaux (Leg. AG ; Ph. AG; det. JCV)



885. - *Calocybe gambosa*, litière feuillus

18 mai 2021 – Chênaux

(Leg. Françoise Meyer)



886. - *Coprinellus micaceus*, souche de feuillus

18 mai 2021 – Chênaux



887. - *Flammulaster carpophilus*, litière de hêtre
18 mai 2021 – Chênaux



888. – *Cladonia fimbriata*, lichen
18 mai 2021 – Chênaux (Leg. & det. Claude Lerat-Gentet)



889. – *Lasiobolus ciliatus*, sur crotte de chien
18 mai 2021 – Chênaux



890. – *Mycena renati*, sur bois mort de hêtre
18 mai 2021 – Chênaux (Leg; F. Meyer)




891. – *Lachnum virgineum*, sur bois mort de hêtre
18 mai 2021 – Chênaux



Poils septés à la base



Spores 8-2 μ m



Poils autour de 40 μ m



892. – *Hyaloscypha hyalina*, sur pins
18 mai 2021 – Chênaux



893. – *Candelariella vitellina*, lichen, sur conifères
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre (Det. & ph. Claude Lerat-Gentet)



894. – *Gymnopus hariolorum*, litière de hêtres
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre



895. – *Peziza arvenensis*, litière de hêtres
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre



896. – *Trichopezizella nidulus*,
Tige morte de Sceau de Salomon
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

897. – *Aleurobotrys botryosus*, sur bois mort, ronce
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre



898. – *Lentinus substrictus*,
bois mort de feuillus
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre

899. – *Trametes gibbosa*, sur branche morte de hêtre
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre (Ph. C. Lerat-Gentet)



900. – *Ganoderma applanatum*
25 mai 2021 – Combe-au-Prêtre





Clé de travail Des Polypores

1. - Basidiomes durs et ligneux à l'état frais, pérennes et présentant plus d'une couche de tubes (ou une croissance de plus d'un an) lorsqu'ils sont coupés verticalement en passant par le centre; ce sont, pour la plupart, de grosses "protubérances" bien visibles sur de grosses branches ou des troncs.....2

1* - Basidiomes plus ou moins annuels et avec une seule couche de tubes14

2. - Contexte et face inférieure des basidiomes rosés ou rougeâtres

Fomitopsis(Rhodofomes) cajanderi

2* - Contexte et surface inférieure des basidiomes non roses.....3

3. - Contexte des basidiomes blancs ou de couleur claire, variant à chamois ou ocre4

3* - Contexte des basidiomes de couleur nettement foncée, souvent brun rougeâtre foncé8

4. - Contexte très amer au goût

Fomitopsis (Laricifomes) officinalis

4* - Contexte pas amer.....5

5. - Tubes en couches très distinctes comme on le voit lorsque les basidiomes sont coupés verticalement à travers le centre.....6

5* - Tubes pas en couches distinctes.....7

6. - Pores anguleux; basidiome blanc au-dessus; sur feuillus seulement, généralement érable

Oxyporus populinus

6* - Pores circulaires; basidiome gris ou rouge dessus; sur feuillus ou conifères

Fomitopsis pinicola

7. - Croissant sur son support de prédilection, la frêne

Perenniporia fraxinea

7* - Croissant sur d'autres hôtes, vivants ou morts

Fomitopsis pinicola

8. - Croissant toujours sur des arbres vivants; basidiome sans croûte supérieure distincte donc basidiome dur et ligneux partout9

8* - Croissant sur des arbres morts; basidiome parfois avec une croûte distincte recouvrant les tissus plus mous11

9. – Croissant sur conifères

Phellinus (Porodaedalea) pini

9* - Croissant sur feuillus..... 10

10. - Croissant uniquement sur Rosacées

Phellinus tuberculosus

10* - Croissant sur *Populus*

Phellinus tremulae

11. - Surface supérieure des basidiomes recouverte d'une croûte dure, en dessous de laquelle le contexte est plus mou.....12

11* - Surface supérieure sans croûte dure, mais basidiome dur et ligneux partout.....13

12. - Basidiomes en forme de sabot, les tubes font 2,5 cm ou plus de long, pas en couches définies

Fomes fomentarius

12* - Basidiomes non en forme de sabot, les tubes plus courts et en couches bien définies

Ganoderma applanatum

13. - Tubes en couches annuelles définies comme on le voit lorsque les basidiomes sont coupés verticalement à travers le centre; sur bouleaux uniquement

Phellinus robustus

13* - Tubes non en couches annuelles définies; souvent sur d'autres hôtes

Phellinus igniarius

Phellinus alni sur *Salix*; *Phellinopsis* (*Phellinus*) *conchatus* ;
Phellinus laevigatus ; *Phellinus lundellii* ; *Phellinus nigricans* sur
bouleau; *Phellinus populicola* ; *Phellinus rhamni*.

14. - Surface inférieure avec des pores sinueux ou avec des pores allongés dans une direction radiale, ou avec des lamelles en forme de champignon (branchies); basidiome jamais stipité.....15

14* - Surface inférieure avec des pores ronds, anguleux ou tubulaires; Basidiome stipité ou non.....28

15. – Contexte blanc ou très légèrement coloré.....	16
15* - Contexte nettement brun.....	23
16. - Croissant sur bois de conifères.....	17
16* - Croissant uniquement sur feuillus.....	19
17. - Surface des pores violette à lilas, au moins près de la marge	
<i>Trichaptum abietinum</i>	
17* - Surface des pores blanche ou crème.....	18
18. - Pores en moyenne d'environ 2 à 3 par mm; trouve principalement sur les feuillus mais aussi sur le genévrier	
<i>Antrodia albida</i>	
18* - Pores en moyenne d'environ 1 à 2 par mm; sur des conifères morts sur pied, rarement sur des feuillus	
<i>Antrodia heteromorpha</i>	
(Si tendre et saturé d'eau, voir <i>Climacocystis borealis</i> 103)	
19. - Face supérieure des basidiomes glabres, zonés ou non.....	20
19* - Face supérieure des basidiomes nettement pubescent et zoné.....	21
20. - Face supérieure du basidiome zonée	
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	
20* - Face supérieure du basidiome non zoné; confiné au chêne et au châtaignier	
<i>Daedalea quercina</i>	
21. - Pores très allongés et formant des lamelles en forme de champignon	
<i>Lenzites betulina</i>	
21* - Pores ronds à sinueux, ne formant jamais de lamelles.....	22
22. - Pores 3 à 4 par mm	
<i>Cerrena unicolor</i>	
22* - Pores d'environ 2 à 3 par mm	
<i>Antrodia albida</i>	
23. - Basidomes de moins de 1 cm d'épaisseur	24
23* - Basidomes de plus de 1 cm d'épaisseur	26
24. - Face supérieure des basidiomes pubescente; contexte brun rouille; uniquement sur bois de conifères	
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	
24* - Face supérieure des basidiomes glabres; contexte brun terne ou plus pâle, pas rouillé.....	25
25. - La face supérieure des basidiomes est à peine zonée; contexte	

brun terre d'ombre ou plus pâle; sur feuillus et conifères

Gloeophyllum trabeum

25* - Face supérieure du Basidiome zonée; contexte à peine brun; sur feuillus

Daedaleopsis confragosa

26. - Croissant seulement sur conifères

Phellinus pini

26* - Croissant seulement sur feuillus.....27

27. - Uniquement sur bois de chêne et de châtaignier; pores de 1 mm ou plus larges

Daedalea quercina

27* - Sur une grande variété de feuillus; pores de moins de 1 mm de large

Daedaleopsis confragosa

28. - Contexte rosâtre, rougeâtre, jaunâtre, brun jaunâtre ou plus foncé.....29

28* - Contexte de couleur blanchâtre ou pâle, couleur bois blanc..51

29. - Contexte résolument rosâtre, rougeâtre ou jaunâtre.....30

29* - Contexte brun jaunâtre ou plus foncé..... 33

30. - Surface des pores rouge foncé, rose ou brun rosâtre.....31

30* - Surface des pores moins colorée.....32

31. - Surface des pores rouge foncé; sur divers feuillus

Pycnoporus cinnabarinus

31* - Surface des pores rose ou brun rosâtre; sur conifères; basidiome de la consistance du liège

Rhodofomes cajanderi

32. - Basidiome charnu, gélatineux sur le dessus

Fistulina hepatica

32* - Basidiome coriace à maturité, pas du tout gélatineux

Hapalopilus croceus

33. - Basidiome avec un stipe plus ou moins distinct.....34

33* - Basidiome collé au support, sans stipe.....38

34. - Croissant sur conifères.....35

34* - Croissant sur feuillus ou au sol.....37

35. - Substance interne du pileus de consistance uniforme, ne formant pas deux couches distinctes

Phaeolus schweinitzii

- 35*** - Substance interne du pileus en deux couches assez distinctes, une supérieure molle et une inférieure plus ferme..... **36**
- 36.** - Contexte du pileus jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Inonotus tomentosus
- 36*** - Contexte du pileus jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Onnia leporina
- 37.** - Pileus couvert d'un vernis rouge ; latéralement stipité latéralement ; sur feuillus
Ganoderma lucidum
- 37*** - Pileus non verni; stipe au niveau central; poussant dans le sol et apparemment non associé au bois
Coltricia perennis
- 38.** - Basidiome verni, rouge
Ganoderma lucidum
- 38*** - Basidiome non verni, non rouge..... **39**
- 39.** - Croissant sur conifères.....**40**
- 39*** - Croissant sur feuillus..... **42**
- 40.** Basidiome comme du liège ou coriace avec surface supérieure glabre
Fomitopsis cajanderi
- 40*** - Face supérieure du basidiome tomenteux..... **41**
- 41.** - Basidiome mou lorsqu'il est frais, cassant lorsqu'il est sec; cystides présentes mais soies absentes
Phaeolus schweinitzii
- 41*** - Basidiome ferme, jamais cassant; soies présentes
Onnia circinata
- 42.** - Basidiome formant une masse plus ou moins globuleuse, avec de nombreux petits chapeaux se chevauchant étroitement
Globifomes graveolens
- 42*** - Basidiome solitaire ou avec quelques chapeaux qui se chevauchent.....**43**
- 43.** - Contexte de couleur brun très clair
Ischnoderma resinosum
- 43*** - Contexte brun jaunâtre ou plus foncé..... **44**
- 44.** - Basidiome virant au violet au rouge au contact d'une solution de KOH; contexte cannelle
Hapalopilus nidulans

- 44*** - Basidiome devenant noir au contact d'une solution de KOH; contexte plus sombre..... **45**
- 45.** - Basidiomes de moins de 5 cm d'épaisseur à leur base..... **46**
- 45*** - Basidiomes de plus de 5 cm d'épaisseur à leur base..... **49**
- 46.** - Contexte généralement de moins de 1 cm d'épaisseur..... **47**
- 46*** - Contexte jusqu'à 2 cm d'épaisseur..... **48**
- 47.** - La face supérieure des basidiomes est nettement zonée
Inonotus radiatus
- 47*** - Surface supérieure de basidiome non zonée ou seulement faiblement
Inonotus cuticularis
- 48.** - Basidiome avec un noyau central strié de blanchâtre, vu lorsqu'il est coupé verticalement à travers le centre; sans soies hyméniales; sur tremble
Inonotus rheades
- 48*** - Basidiome sans noyau central strié de blanchâtre; soies hyméniales présentes; sur une variété de feuillus, en particulier le chêne
Phellinus gilvus
- 49.** - Face supérieure des basidiomes assez poilue
Inonotus hispidus
- 49*** - Face supérieure des basidiomes non poilue..... **50**
- 50.** - Basidiome avec un noyau central strié de blanchâtre tel que vu lorsqu'il est coupé verticalement à travers le centre; sur les troncs de chênes vivants
Inonotus dryophilus
- 50*** - Basidiomes sans noyau central; trouvé à la base de chênes vivants ou autour de souches d'arbres récemment abattus
Inonotus dryadeus
- 51.** - Basidiomes à stipe plus ou moins distinct, ramifié ou non ramifié.....**52**
- 51*** - Basidiome sans stipe.....**65**
- 52.** - Surface supérieure et tige recouvertes d'un vernis rougeâtre..**53**
- 52*** - Basidiomes pas du tout vernis, bien que parfois rougeâtres...**54**
- 53.** - Sur bois de conifères uniquement; contexte blanc
Ganoderma tsugae
- 53*** - Sur feuillus seulement; contexte pas blanc pur
Ganoderma lucidum

- 54.** - Stipe plus ou moins ramifié, produisant plusieurs ou plusieurs chapeaux..... **55**
54* - Stipe non ramifié et ne produisant qu'un seul pileus, bien que les stipes de deux ou plus puissent devenir confluent.....**57**
55. - Chapeaux petits (principalement moins de 7 cm de large) et nombreux

Grifola frondosa

- 55*** - Chapeaux en nombre moindre mais plus grands (souvent 10 cm ou plus de large)..... **56**
56. - Basidiome devenant noirâtre à l'endroit où il est manipulé et en séchant; spores lisses

Meripilus giganteus

- 56*** - Basidiome ne devenant pas noirâtre; spores rugueuses

Bondarzewia berkeleyi

- 57.** - Surface des pores jaune soufre brillant sur le frais

Laetiporus sulphureus

- 57*** - La surface des pores n'est pas jaune soufre brillante..... **58**
58. - Pileus ne dépassant pas 5 cm de large..... **59**
58* - Pileus plus grand..... **62**

- 59.** - Pileus écailleux, rougeâtre; stipe peu développé

Polyporus alveolaris

- 59*** - Pileus dans des tons plus bruns; stipe bien développé..... **60**
60. - Pileus brun fumé ou noir fumé

Polyporus brumalis

Pores très peu visibles : ***Lentinus substrictus***

- 60*** - Pileus de couleur beige.....**61**
61. - Stipe noir à la base

Polyporus varius

- 61*** - Stipe non noir à la base

Polyporus arcularius

- 62.** - Poussant au sol, non associé au bois

Albatrellus ovinus

- 62*** - Croissant sur bois.....**63**
63. - Pileus convexe, la marge dépassant vers le bas sous le niveau des tubes; pâle à brun pâle sur le dessus

Piptoporus betulinus

- 63*** - Pileus plan à déprimé, sans marge en surplomb..... **64**

64. - Pileus saumon rosé ou rougeâtre à l'état frais

Laetiporus cincinnatus

64* - Pileus châtain ou plus foncé, inchangé au séchage

Polyporus badius

65. - Basidiome de 1-3 cm de diamètre, presque globuleux; uniquement sur bois de conifères

Cryptoporus volvatus

65* - Basidiome pas comme ci-dessus..... **66**

66. - Trouvé seulement sur de petits membres morts d'orme; de couleur blanc pur et portant un petit corps en forme de coupe brunâtre sur la surface supérieure

Poronidulus conchifer

66* - Pas comme ci-dessus.....**67**

67. - Marge du chapeau faisant saillie vers le bas de 5 mm ou plus au-delà des pores; tubes séparables en une couche lisse du reste des basidiomes; trouvé uniquement sur bouleau

Piptoporus betulinus

67* - Basidiome pas comme ci-dessus**68**

68. - Surface des pores jaune soufre brillant quand frais

Laetiporus sulphureus

68* - Surface des pores non jaune soufre, parfois légèrement jaunâtre au séchage.....**69**

69. - Basidiome de couleur plus ou moins entièrement brune, brun noirâtre ou brun rouille.....**70**

69* - Basidiome de couleur non entièrement brune.....**72**

70. - Basidiome très poilu sur la face supérieure; trouvé uniquement sur les saules et les peupliers

Coriolopsis gallica

70* - Basidiome peu poilu; généralement sur d'autres hôtes.....**71**

71. - Basidiome de 10 cm ou plus de large

Ischnoderma resinosum

71* - Basidiome beaucoup plus petit

Antrodia serialis

72. - Surface des pores plus ou moins fumée ou noire.....**73**

72* - Surface des pores non noirâtre.....**77**

73. - Basidiomes de plus de 5 mm d'épaisseur.....**74**

73* - Basidiomes de moins de 5 mm d'épaisseur.....**75**

74. - Pores 3 à 4 par mm; Basidiome sans odeur distinctive

Bjerkandera fumosa

- 74*** - Pores 1 à 2 par mm; basidiome avec une agréable odeur d'anis
Trametes suaveolens
- 75.** - Basidiome à peine poilu au-dessus, non zoné
Bjerkandera adusta
- 75*** - Basidiome nettement poilu sur la surface supérieure, généralement distinctement zoné.....**76**
- 76.** - Surface supérieure des basidiomes marquée de zones de couleurs contrastées
Trametes versicolor
- 76*** - Surface supérieure sans zones de couleurs différentes
Trametes hirsuta
- 77.** - Basidiome fibreux, dur et coriace lorsqu'il est frais ou gorgé d'eau.....**78**
- 77*** - Basidiome tendre et spongieux plein d'eau mais ferme, de la consistance du liège, lorsqu'il est frais.....**92**
- 78.** - Les pores se brisent rapidement en dents.....**79**
- 78*** - Pores peu ou pas du tout dentés..... **86**
- 79.** - Basidiomes de moins de 4 mm d'épaisseur.....**80**
- 79*** - Basidiomes de plus de 4 mm d'épaisseur.....**84**
- 80.** - Croissance uniquement sur bois de conifères; surface des pores de couleur lilas à violette, du moins à l'état jeune
Trichaptum abietinum
- 80*** - Croissance sur feuillus, moins fréquemment sur conifères; si sur conifères, les pores ni lilas ni violets**81**
- 81.** - Basidiome blanc et moins de 1 cm de la marge au point d'attache
Irpex lacteus
- 81*** - Basidiome gris ou d'une autre couleur, et à plus de 1 cm de la marge au point d'attache.....**82**
- 82.** - Face supérieure des basidiomes fortement pubescente
Cerrena unicolor
- 82*** - Face supérieure des basidiomes légèrement pubescente.....**83**
- 83.** - Tubes 3-6 mm long
Trametes pubescens
- 83*** - Tubes 1-3 mm long
Trichaptum biforme
- 84.** - Pores grands, en moyenne 1 à 2 par mm
Trichaptum biforme

84* - Pores plus petits, en moyenne de 3 à 4 par mm.....**85**

85. - Surface supérieure visiblement poilue et rarement blanche;
pores grisâtres

Trametes hirsuta

85* - Surface supérieure moins poilue, blanc pur ou avec quelques
couleurs brun orangé clair; pores âgés jaune brun à ocre

Trametes pubescens

86. - Croissance uniquement sur bois de conifères; surface des
pores de couleur lilas à violette, du moins à l'état jeune

Trichaptum abietinum

86* - Croissance sur feuillus, moins fréquemment sur conifères; si
sur conifères, les pores ni lilas ni violets.....**87**

87. - Pores de 3 à 7 mm de long; pileus de 1 à 2 cm d'épaisseur;
surface des pores blanche à jaunâtre; sur chêne et châtaignier; sec,
très dur

Fomitopsis spraguei

87* - Basidiome plus mince; pas comme ci-dessus.....**88**

88. Surface des pores lavande ou lilas à la marge des basidiomes;
surface supérieure non avec des zones colorées étroites**89**

88* - Surface des pores sans couleurs lavande, lilas, rougeâtre ou
violet rougeâtre..... **90**

89. - Surface des pores lavande ou lilas à la marge des basidiomes;
surface supérieure non avec des zones colorées étroites

Trichaptum biforme

89* - Surface des pores rougeâtre à violet rougeâtre à l'état frais et
se décollant en une fine couche caoutchouteuse

Gloeoporus dichrous

90. - Surface supérieure des basidiomes marquée de nombreuses
zones étroites et de couleurs différentes

Trametes versicolor

90* - Surface supérieure du basidiome zoné mais de couleur
uniforme.....**91**

91. - Surface supérieure visiblement poilue et rarement blanche;
pores grisâtres

Trametes hirsuta

91* - Surface supérieure moins poilue, blanc pur ou avec quelques
couleurs brun orangé clair; pores jaune brun à ocre en vieillissant

Trametes pubescens

92. - Basidiome de la consistance du liège.....	93
92* - Basidiome soit doux, spongieux et plein d'eau, soit ferme et liégeux lorsqu'il est frais	98
93. - Basidiomes de moins de 2 cm d'épaisseur.....	94
93* - Basidiomes de plus de 2 cm d'épaisseur.....	95
94. - Poussant sur les saules et les peupliers; odeur agréable, semblable à l'anis	
	<i>Trametes suaveolens</i>
94* - Croissance principalement sur criquets ; sans odeur d'anis	
	<i>Perenniporia robiniophila</i>
95. - Pores petits, en moyenne de 4 à 6 par mm, souvent grisâtres	
	<i>Bjerkandera fumosa</i>
95* - Pores plus grands.....	96
96. - Pores en moyenne d'environ 1 à 2 par mm; sur des conifères morts sur pied, rarement sur des feuillus	
	<i>Antrodia heteromorpha</i>
96* - Pores plus petits, en moyenne de 2 à 3 par mm; principalement sur feuillus.....	97
97. - Basidiome, y compris les pores, blanc; trouve principalement sur les feuillus mais aussi sur le genévrier	
	<i>Antrodia albidus</i>
97* - Basidiome, y compris les pores, brun pâle	
	<i>Antrodia malicola</i>
98. - Surface des pores immédiatement jaunâtre sale là où elle est contusionnée	
	<i>Postia fragilis</i>
98* - La surface des pores n'est pas si décolorée.....	99
99. – Basidiomes mesurant généralement plus de 4 cm de long...	100
99* - Basidiomes mesurant généralement moins de 4 cm de long	102
100. – Surface des pores nettement rougeâtre	
	<i>Gloeoporus dichrous</i>
100* - Surface des pores blanchâtre ou seulement légèrement jaunâtre ou bleuâtre.....	101
101. – Basidiome plutôt poilu sur la face supérieure	
	<i>Postia caesia</i>
101* - Basidiome non poilu	
	<i>Tyromyces chioneus</i>
102. - Croissance uniquement sur conifères.....	103

102* - Croissance uniquement sur feuillus.....**104**

103. - Tubes généralement moins de 5 mm de long, les pores mesurant en moyenne 4 à 5 par mm

Climacocystis borealis

103* - Tubes généralement moins de 5 mm de long, 4 à 5 pores en moyenne par mm

Postia guttulata

104. - Pores en moyenne de 0,5 à 2 par mm.....**105**

104* - Pores en moyenne de 3 à 5 par mm.....**106**

105. - Tubes de 1,5 à 3 cm de long; uniquement sur chêne

Spongipellis unicolor

105* - Tubes de 0,5 à 1,5 cm de long; sur divers feuillus

Spongipellis delectans

106. - Croissance uniquement sur chêne et châtaignier ; sec, très dur


Fomitopsis spraguei

106* - Croissance sur d'autres hôtes; sec, plus mou

Spongipellis spumeus

Ont contribué
à la réalisation
de ce compte-rendu :

- ▶ Alain GARDIENNET
- ▶ Denis BRULARD
- ▶ Joël MARCEAUX
- ▶ Roland ROUSSEAUX
- ▶ Fabrice TATTU
- ▶ Jean-Claude VERPEAU



Année 2021





2015

2016

2017



2020

2021

**900 espèces
inventoriées...**



2018

2019

