



► *Trichonectria rubefaciens*

389

(Ellis & Everh.) Diederich & Schroers



Bois de feuillus



Sur lichen



Peu fréquent

1 : Asques unituniqués, cylindriques ou quelque peu clavés, mesurant environ 30-40 x 5-11 μm , possédant 8 ascospores hyalines, 14-24 x 2-4 μm , 1 (3) septées.
2 : Poils hyalins très courts de la zone ostiolaire, parfois uniseptés.

Ascomes globuleux, oranges, 80-160 μm de diamètre, ne réagissant pas à la potasse, possédant une couronne de poils hyalins de 10-12 μm de diamètre à la base, parfois uniseptés. Présents en surface du lichen décoloré. Pas rare.

Sur lichen (*Pleurosticta acetabulum*).

Combe de Brochon, maille 3023D21, le 26 novembre 2016.

► Petit pyrénomycète lichénicole déjà observé un certain nombre de fois en Côte-d'Or, y compris dans la Réserve. Se rencontre également sur d'autres *Parmeliaceae* dont *Parmelia sulcata* (Combe Saint-Martin, le 17-11-2014) et *Flavoparmelia caperata*. Etude microscopique indispensable pour la détermination, étant donné le nombre d'hypocréales lichénicoles ressemblantes.