



► *Entoloma mougeotii* (Fr.) Hesler



Pelouse
sèche

1 : Spores hétérodiamétriques à 5-9 angles, 9-11,5 x 6-8 µm.

2 : Cheilocystides cylindriques à clavées, pigment violet intracellulaire.

3 : Revêtement piléique en trichoderme, à éléments terminaux en massue. Pigment intracellulaire, grisâtre.

Xéro-
bromion

Chapeau 1-5 cm, convexe au centre ombiliqué, non hygrophane, marge non striée enroulée, irrégulière, tomenteux puis squamuleux et rimeux avec l'âge, gris violacé, centre plus sombre. Lames plus ou moins adnées, arquées, blanches à crème puis roses. Stipe fibrilleux de fibrilles sombres, base tomenteuse de blanchâtre, gris d'acier. Odeur faible, agréable.

Peu
fréquent

Marais temporaire sur dalle à *Allium schoenoprasum*.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 15 juin 2018.

► L'identification des Entolomes à chapeau et stipe plus ou moins bleus du sous-genre *Leptonia*, à boucles nulles et cellules marginales présentes n'est pas toujours aisée. *Entoloma mougeotii*, d'abord d'un beau bleu assez sombre tourne à un bleu-gris un peu violacé particulier.