




► *Basidiiodendron cinereum*

(Bourdot & Galzin) Luck-Allen



Leg. JCV & det. JCV

1

2

3

- 1 : Spores ellipsoïdes, hyalines, guttulées, distinctement apiculées, $10,6-11,3 \times 6,1-6,5 \mu\text{m}$.
 2 : Hypobasides ovales, $15-16 \times 11-12 \mu\text{m}$, septées longitudinalement, à 2-4 épibasides.
 3 : Gléocystides, ondulées, à contenu parfois brunâtre, $30-50 \times 6-9 \mu\text{m}$.

Fructification entièrement résupinée, formant des revêtements minces, céracés, s'étalant sur plusieurs centimètres ou décimètres. Surface lisse, mate, finement duvetée sous la loupe, bleutée, puis gris-blanchâtre.

Sur bois mort de feuillu.

Combe Saint-Martin, maille 3023D14, le 5 juin 2017.

► Les espèces dépourvues d'hyphides ramifiées, à basides en grappes et à gleocystides mesurant à peine $90 \mu\text{m}$ ont été transférées du genre *Sebacina* au genre *Basidiiodendron*. Ce dernier est caractérisé par ses basides avec septa longitudinaux, ses involucres (restes de vieilles basides) et ses boucles à la base des basides.