




Leg JCV & det JCV



1 : Spores 8-11,6 x 7,9,5 µm, à verrues épineuses assez robustes mais souvent obtuses.
2 : Cystides fusoides, atténuées et souvent pointues, 70-100 x 8-15 µm, noircissant assez peu dans les réactifs sulfo-aldéhydiques.

Libère

Feuilles

Chapeau 8-20 cm, subglobuleux puis convexe, sec et mat, prumineux, ridulé concentriquement vers le bord, panaché de rouge vineux. Lames plus espacées avec l'âge, crème puis jaune ochracé. Arête parfois soulignée de rouge vers la marge. Stipe 6-12 x 2-4 cm, cassant, ridulé ou pointillé, rose lilas, au moins en haut, un peu jaunissant par la base. Saveur douce.

Dans la pente, sous feuillus..

Bois Plein-de-la-Belle-Croix, maille 3023D23, le 4 juillet 2017.

► *R. olivacea* se caractérise par l'épicutis remarquablement homogène ne comprenant ni dermatocystides, ni hyphes primordiales incrustées. Enfin, la réaction au phénol, couleur de «mûre écrasée» achève de faire de cette russule l'une des plus caractéristiques du genre. Bien que toutes les russules douces soient supposées comestibles, *Russula olivacea* semble faire exception puisque des intoxications assez graves lui ont été imputées.