

# ► *Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm.




Leg. JCV & det. JCV

Litière



1



2

1 : Spores à 5-7 angles, 7-10 x 6-8 µm.  
2 : Boucles abondantes, pas de cystides.

Feuillus

Chapeau 2-7 cm, plan-convexe enfin plan, très hygrophane, marge infléchie striée par transparence, brun jaunâtre pâle, pâissant en blanchâtre sordide. Lames émarginées à adnées, peu serrées, ventruées, blanchâtres puis rose sale à reflets grisâtres. Stipe fragile, flexueux, fistuleux, soyeux à fibrilleux par des fibrilles argentées, 3-10 x 0,5-1 cm, blanc à reflets jaunâtre pâle. Chair mince, fragile, blanche, odeur nitreuse ou d'eau de Javel.

Dans la litière, sous feuillus, côté ubac.

Combe Saint-Martin, maille 3023D23, le 2 octobre 2017.

Fréquent

► L'*Entoloma rhodopolium* est très variable et il existe, semble-t-il, toutes les variations possibles entre le type et les différentes formes, tant au niveau aspect qu'au niveau de l'odeur. Certains auteurs maintiennent la forme *nidorosus* lorsque l'odeur d'eau de Javel est manifeste.