




Leg AG & det AG

1

2

1 : Anamorphe : *Clonostachys ralfsii* – conidiogénèse et conidiomata.

2 : Ascospores hyalines, largement ellipsoïdes, uniseptées, lisses à finement verruqueuses, 17-20 x 6,5-7,5 µm.

Périthèces solitaires ou en petits groupes de 10 maximum présents sur l'écorce, globuleux ou largement obovoïdes, 300-400 µm de diamètre, jaune-orange à orange-rose pâle à grosses verrues plus claires. Se rencontre parfois avec son anamorphe (*Clonostachys ralfsii*, photo 1) qui fait des coussinets verdâtres à noirs présents au départ sur un mycélium blanc. Peu fréquent.

Sur buis (*Buxus sempervirens*).

Combe Lavaux, à la barrière, maille 3023D14, le 23 septembre 2017.

► *Bionectria ralfsii* peut se rencontrer sur plusieurs substrats (*Abies*, *Ulex*...) autres que le buis. Mais dans la Réserve, sur ce dernier, on arrive à trouver ce pyrénomycète peu fréquent quand on sait le chercher. Attention toutefois car d'autres espèces du même genre sont également buxicoles : *B. levigata*, *B. ochroleuca* et *B. coronata* (sur feuille). Même si on reconnaît bien *B. ralfsii* avec ses grosses verrues et sa tendance à se cupuler en séchant, il conviendra de faire une étude approfondie.