



- 1 : Réaction orange des pigments dans KOH.
 2 : Coupe verticale d'un stroma montrant des granules rouges entre les périthèces. 4 : Coupe horizontale montrant la même chose.
 3 : Vue grossie d'un stroma où l'on distingue les ostioles papillés.
 5 : Asques octosporés J+ ; ascospores 14-19 x 6,5-7,5 µm, avec sillon germinatif droit sur la longueur de la spore.



Bois mort



Feuillus



Rare

Stromas étalés de couleur variable allant du brun fauve au gris, laissant entrevoir à la surface les ostioles papillés des périthèces. Vient sur bois décortiqué, ici sur *Salix cinerea* dans un marais de pente. Rare (Première observation en Côte-d'Or).

Sur branche morte de saule (*Salix cinerea*) attenante, décortiquée. Combe de la Côte-au-Cimetière, maille 3022B43, le 6 février 2016.

► *Hypoxylon julianii* est une espèce rare, discrète qui vient dans la même écologie que des taxons plus courants que sont *H. rutilum* ou *H. rubiginosum*. Un examen attentif est donc nécessaire pour le déterminer. Notamment les ascomes papillés, la réaction orange à la potasse des pigments, la couleur rouge de granules présents entre les périthèces sont des bons critères pour le distinguer.