



1 : Spores 7-9,5 x 4,5-6  $\mu\text{m}$ , elliptiques ou un peu en amande de profil.

2 : Cheilocystides 25-55 x 10-18  $\mu\text{m}$ , ventrues à sommet aminci en col obtus plus ou moins étiré, renfermant une inclusion globuleuse, jaune vif dans l'ammoniaque (chrysocystides).



Mousses  
humides



Épicéas



Fréquent

Chapeau 2-7 cm, convexe ou presque plat, lisse, visqueux puis sec et un peu brillant, bleu verdâtre assez pâle ou tendre, décolorant par taches en jaune ou jaune ochracé. Marge appendiculée de fibrilles ou de flocons blancs fugaces. Arête des lames concolore. Stipe 4-10 x 0,3-1 cm, à rhizoïdes blancs, concolore ou d'un bleu plus tendre.

Dans la mousse d'un bois d'épicéa.

Combe-au-Prêtre, maille 3022B33, le 21 octobre 2016.

► *S. aeruginosa* est plus foncée (bleu-vert foncé), à marge plus longtemps garnie de flocons blancs, avec un anneau plus ample mais fragile, les rhizoïdes moins copieux ; elle vient plutôt en forêt. Les lames sont vite plus foncées et l'arête des lames est franchement givrée de blanchâtre, contrastant nettement avec les faces.