



Leg. AG & det. AG




Litière



Feuillus
mêlés



Peu
fréquent



1

1 : Spores brunes amygdaliformes, à ornementation moyenne, 8,5-12 x 5,5-6,5 μm .

Chapeau 40-75 mm de diamètre, très charnu, hémisphérique convexe, à marge enroulée nettement infléchie. Revêtement visqueux puis sec, légèrement feutré, couverts de fibrilles brun-rouge radiales sur un fond violet-mauve vif, le centre se décolorant en roux orangé. Stipe 50-70 x 12-17 mm, subégal jusqu'à un bulbe en oignon atténué en pointe à la base, finement fibrilleux, blanc à peine glaucescent au sommet et se tachant d'ochracé à partir du bulbe. Chair blanchâtre, légèrement rosée dans le bulbe, réagissant nettement à tous les produits chimiques usuels. Lames serrées, falquées, adnées ou légèrement sinuées, argilacées à reflets mauves sur le bord. Peu fréquent.

Sous épicéas, érables et hêtres, sur sol calcaire.
Messigny, moulin du Rosoir, maille 3022D21, le 22 octobre 2017.

► Ce *Phlegmacium* de la série *balteatus* peu fréquent est remarquable par la couleur violette du fond du chapeau. Comme toute espèce du genre, il faut être un spécialiste bien documenté pour pouvoir le déterminer et le différencier des autres espèces.